

Description de deux nouveaux genres de Cynipides

par l'abbé J.-J. KIEFFER.

Fioria n. g. — Ce genre se distingue de *Callirhytis*, auquel je l'avais d'abord réuni, par les caractères suivants : Corps non trapu, mais allongé comme chez *Synophrus*. Front excavé, traversé par une arête médiane et longitudinale qui s'étend de l'ocelle intermédiaire jusqu'entre les antennes et forme ainsi deux fossettes longitudinales. Mesosternum allongé et muni de trois arêtes longitudinales et parallèles, dont les deux latérales sont plus courtes que la médiane. Hanches antérieures séparées des intermédiaires par une distance qui dépasse leur longueur. Arêtes du metanotum circonscrivant une aire en trapèze. Second segment abdominal égal au tiers de l'abdomen, les cinq suivants proéminents et d'égale longueur. Comme dans le genre *Callirhytis*, la cellule radiale est ouverte, la base du scutellum munie de deux fossettes, les crochets des tarsi simples, les sillons parapsidaux plus ou moins évanouis en avant et l'abdomen avec une spinule ventrale.

Ce nouveau genre a pour type un insecte dont la forme agame m'a été envoyée d'abord par M. Fiori, professeur à l'Université de Bologne, puis par M. Mariani, sous-inspecteur des forêts à Velletri; j'ai décrit cette dernière sous le nom de *Callirhytis Mariavii*. La forme sexuée, que j'ai décrite sous le nom de *Callirhytis Meunieri*, a été obtenue de galles produites à Bitche par les insectes agames que j'avais reçus d'Italie.

Liebelia n. g. — Antennes de la femelle composées de 16 articles. Pronotum rétréci en ligne au milieu. Mesonotum lisse, glabre, à sillons parapsidaux percurrents. Fossettes de la base de l'écusson indiquées seulement par deux légères dépressions éloignées l'une de l'autre. Second segment abdominal n'atteignant pas la moitié de l'abdomen; les cinq segments suivants proéminents; spinule ventrale courte. Crochets des tarsi simples. Cellule radiale ouverte.

Le type de ce genre, dont la description paraîtra prochainement dans un autre travail, forme sur *Rosa Seraphini* des galles pluriloculaires qui n'ont été observées jusqu'ici qu'en Sardaigne et qui ont été décrites d'abord par le Dr C. Massalongo (*Nuovo Giornale botanico Italiano*, 1895, p. 99-102, pl. 3).
